

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 72-58-72)

12 NF

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

NP 9 Supplément n° 4
Toutes régions

AVERTISSEMENTS

TAVELURE

Si dans beaucoup de vergers la maladie cesse d'être inquiétante en raison du relèvement de la température et de la fin de la période pluvieuse, il est par contre utile de continuer les traitements dans les vergers de vallée et en toutes situations où l'on observe des rosées matinales.

CARPOCAPSE

Le réchauffement général de la température accroît l'activité de l'insecte.

D'une part la métamorphose de la totalité des chenilles hivernantes s'achève, d'autre part les papillons de 1ère génération continuent leurs pontes.

La protection des fruits est absolument nécessaire à partir du 25 juin.

TORDEUSE ORIENTALE

Commencer la série des traitements sur les fruits (abricots, pêches et poires) devant être récoltés vers le 15 juillet.

INFORMATIONS

LES MINEUSES DES FEUILLES DE POMMIERS

Un certain nombre d'espèces de lépidoptères sont responsables de dégâts sur les feuilles de pommiers.

Les chenilles vivent en mineuses entre les deux épidermes et d'après les dégâts on peut distinguer :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - la mineuse sinueuse | - la mineuse élargie |
| - la mineuse cerclée | - la mineuse marbrée |

Deux espèces sont surtout nuisibles dans les Cévennes et le Conflent :

- la mineuse sinueuse	et	- la mineuse cerclée
-----------------------	----	----------------------

Ces deux espèces ont des caractères communs :

- plusieurs générations se succèdent pendant l'été
- les mines peuvent entraîner la chute quasi totale ou totale des feuilles.

Une nouvelle génération de ces deux espèces est à prévoir à partir du 25 JUIN.

Dans les vergers où la première génération a fait des dégâts, un traitement peut être conseillé avec un des insecticides suivants :

- | | | |
|--------------|-------------|-------------|
| - Diméthoate | - Gusathion | - Parathion |
|--------------|-------------|-------------|

TRAITEMENTS DES ABRICOTIERS

(Pyrénées-Orientales)

Nous recommandons l'exécution d'un traitement dès la fin de la récolte afin d'enrayer le développement de l'Oïdium et de la rouille.

Exécuter ce traitement en associant un produit cuprique ou cupro-organique à du soufre micro-nisé ou à du Karathane.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
P. BERVILLE

Les Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles,
L.L. TROUILLON R. MARIO

Montpellier le 21 Juin 1961

Imprimerie de la Station Languedoc-Roussillon - Le Directeur Gérant : L. BOUYX

7388